

Bilag 1, Tabel 4: Maksimale græsoptag pr. dyretype

Maksimale græsoptag pr. dyretype <sup>1</sup>		
Dyretype	Enhed	Maksimal græsoptagelse, FE pr. enhed <sup>2</sup>
Malkeko, tung race (1 årsko uden opdræt)	1 årsko	4.013
Malkeko, Jersey (1 årsko uden opdræt)	1 årsko	3.360
Ammeko, under 400 kg (1 årsko uden opdræt) <sup>3</sup>	1 årsko	1.602
Ammeko, 400-600 kg (1 årsko uden opdræt) <sup>3</sup>	1 årsko	2.228
Ammeko, over 600 kg (1 årsko uden opdræt) <sup>3</sup>	1 årsko	2.618
Opdræt, kvier 0-6 mdr. tung race (både malkekøer og ammekøer)	1 årsopdræt	259
Opdræt, kvier/stude tung race 6 mdr. – kælvning (27 mdr.)/slagtning (både malkekøer og ammekøer)	1 årsopdræt	2.141
Opdræt, kvier 0-6 mdr. Jersey (både malkekøer og ammekøer)	1 årsopdræt	218
Opdræt, kvier/stude jersey 6 mdr. – kælvning (25 mdr.)/slagtning (både malkekøer og ammekøer)	1 årsopdræt	1.820
Slagtekalv, tung race, 0 - 6 mdr.	1 produceret slagtekalv	259
Slagtekalv, tung race, 6 mdr. – slagtning (410 kg)	1 produceret slagtekalv	208
Slagtekalv, jersey, 0 - 6 mdr.	Udgår	Udgår
Slagtekalv, jersey, 6 mdr. – slagtning (328 kg)	Udgår	Udgår
Slagtekalv af kødkvæg, 6-15 mdr. <sup>4</sup>	1 produceret slagtekalv	1.060
Hest, under 300 kg	1 årshest	1.129
Hest, 300 kg – mindre end 500 kg	1 årshest	1.777
Hest, 500 kg – mindre end 700 kg	1 årshest	2.377
Hest, 700 kg og derover	1 årshest	2.741
Får, moderdyr med afkom	1 årsfår	711
Mohairged, moderdyr med afkom	1 årsged	711
Kødged, moderdyr med afkom	1 årsged	711
Malkeged, moderdyr med afkom	1 årsged	711
Hjorte > 15 mdr.	10 stk.	10.846
Hinder > 15 mdr.	10 stk.	9.040
Unge hjorte 3-15 mdr.	10 stk.	6.873
Unge hinder 3-15 mdr.	10 stk.	5.882
Årshind	1 stk.	923
Dådyr	1 stk.	537
Økologisk årssø, staldperiode 120 - 185 dage, græsofodring via rodemateriale	1 årssø	50
Konventionel årssø, græsofodring via rodemateriale	1 årssø	125
Smågrise, fravæning til 31 kg (konv. og øko.), græsensilage som rodemateriale	10 producerede smågrise	10
Slagtesvin (konv. og øko.) fra 31 kg til slagtning, græsensilage som rodemateriale	10 producerede slagtesvin	50

1) Normen kan kun opnås ved opfodring af eller afgræsning med de nævnte dyretyper.  
2) Ved afgræsning med dyr, som ikke er virksomhedens egne, lægges det til grund, at det maksimale foderoptag ved overførsel af 100 kg kvælstof er 4.000 FE.  
3) For avlstyre anvendes værdierne for årsammekøer for den tilsvarende vægtklasse.  
4) Dyretypen "Slagtekalv af kødkvæg, 6-15 mdr." fremgår ikke af bilag 2 om "Husdyrnormer m.v." Slagtekalve af kødkvæg skal i gødningsregnskabet indberettes under dyretypen "Slagtekalv, tung race, 6 mdr. – slagtning (410 kg)". Det maksimale græsoptag beregnes automatisk ud fra 208 FE pr. enhed og ikke ud fra tabelværdien på 1.060 FE pr. enhed. Det maksimale græsoptag skal derfor for denne dyretype beregnes manuelt ud fra 1.060 FE pr. enhed.